

AUS DER MED. UNIVERSITÄTSKLINIK BASEL (PROF. R. STAEHELIN) UND
DEM. SCHWEIZERISCHEN INSTITUT FÜR HOCHGEBIRGSPHYSIOLOGIE UND
TUBERKULOSEFORSCHUNG IN DAVOS (PROF. A. LOEWY)

**VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNGEN IM TIEFLAND
UND HOCHGEBIRGE ÜBER DAS VERHALTEN
VON GRUNDUMSATZ UND SENKUNGS-
REAKTION BEI TUBERKULÖSEN**

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE

DER

HOHEN MEDIZINISCHEN FAKULTÄT

DER

UNIVERSITÄT BASEL

VORGELEGT VON

HERMANN KAPP

MED. PRAKT. AUS BASEL

VERLAGSBUCHHANDLUNG JULIUS SPRINGER IN BERLIN. 1928

Von der medizinischen Fakultät Basel
genehmigt auf Antrag von Prof. R. Staehelin





Digitized by the Internet Archive
in 2026

Während wir über die physiologischen Wirkungen großer Höhen auf das Verhalten der Atmung und des Grundumsatzes relativ gut unterrichtet sind, wissen wir noch wenig Sicheres über die Beeinflussung des kranken Organismus durch die therapeutisch wichtigen mittleren Höhen. Auch über die Veränderungen der Blutkörperchen-Senkungsreaktion, die in den letzten Jahren gerade durch ihre Beziehungen zur Tuberkulose wichtig geworden ist, durch die Höhe ist sehr wenig bekannt. Und doch liegt der Gedanke nahe, daß gerade in der durch äußere Reize leicht zu verändernden Atemmechanik, der regelmäßigsten Veränderung im Hochgebirge, ferner im Grundumsatz und in der Blutkörperchen-senkungsreaktion, die ein außerordentlich empfindlicher Indikator für gewisse Veränderungen im Eiweißstoffwechsel ist, die Höhenklimatherapie der Tuberkulose ihre Hauptangriffspunkte hat.

Hill und *Campbell*¹ untersuchten den *Gaswechsel* von Tuberkulösen in Montana (1800 m) bei Besonnung und Wind. Sie verglichen die gefundenen Zahlen mit den bekannten Standardwerten und fanden auffallend große Steigerungen (bis zu 79 %) des Gaswechsels. In letzter Zeit haben *Vogel-Eysern*² und *Lanz*³ bei Tuberkulösen den Grundumsatz im Hochgebirge verfolgt. Da die Tuberkulose an sich schon den Grundumsatz verändert und so individuell große Unterschiede bestehen, so können die gefundenen Steigerungen über die Standardwerte nicht dazu dienen, um über die Wirkung des Höhenklimas auf Tuberkulose Aufschluß zu geben.

Die einzigen vergleichenden Untersuchungen im Tiefland und Hochgebirge sind von *Dumarest* und *Maignon*⁴ 1911 angestellt worden. Sie haben bei 15 Tuberkulösen verschiedener Stadien den Gaswechsel vergleichend in Lyon (180 m) und Hauteville (900 m) untersucht. Ihre Untersuchungen wurden jedoch unter dem Gesichtspunkte vorgenommen, wie sich der Gaswechsel im Verhältnis zu der durch das Klima bedingten Besserung bzw. Verschlimmerung der Tuberkulose gestaltet, dagegen wurde der Höhenklimawirkung an sich keine Beachtung geschenkt. Zudem beträgt die Höhendifferenz, unter welcher sie arbeiteten, bloß 720 m.

Über die Beeinflussung der *Senkungsreaktion* bei Tuberkulösen durch das Höhenklima wissen wir nichts. Beim Gesunden soll die Senkungsreaktion während der Dauer der Aklimatisation im Hochgebirge vermehrt sein (*Hediger*⁵).

In neuerer Zeit wurde der *Erregbarkeit des Atemzentrums* in Beziehung zur Tuberkulose (*Binet*⁶) und der Veränderung der Erregbarkeit im Höhenklima beim Gesunden mehr Beachtung geschenkt. Sie wurde beim Gesunden gesteigert gefunden (*Hasselbach* und *Lindhard*⁷, *Rohrer*⁸; vgl. aber auch *Loewy*⁹). Beim Lungentuberkulösen im Hochgebirge liegen noch keine Beobachtungen vor.

Wir stellten uns daher die *Aufgabe*, bei einer größeren Anzahl von Tuberkulösen die Wirkung einer Höhendifferenz von 1350 m, wie sie bei der Klimatherapie der Tuberkulose meist in Frage kommt, auf Grundumsatz, Atemmechanik, Senkungsreaktion der roten Blutkörperchen und Erregbarkeit des Atemzentrums festzustellen. Es sollte dabei vor allem der Einfluß des verminderten Luftdruckes untersucht werden, andere wichtige Klimaelemente, wie Temperatur, Bestrahlung, Wind, sollten nicht besonders berücksichtigt werden.

Material. Die Untersuchungen wurden im Winter 1924—1925 (Dezember bis März) einerseits in Basel (250 m) andererseits in Davos (1600 m) durchgeführt. Sie bildeten die Fortsetzung von einigen Vorversuchen, die 1923 und 1924 Prof. A. Loewy und Dr. K. von Neergaard vergleichsweise in Basel und Davos ausgeführt hatten. Diese Fälle werden teilweise mitverarbeitet werden. Das Hauptmaterial bilden jedoch Untersuchungen an 29 Patienten mit Lungentuberkulose verschiedener Stadien, die von Basel nach Davos in die Basler Heilstätte zur Kur geschickt wurden. Die Patienten wurden von der Aufnahmekommission der Basler Heilstätte (Prof. F. Egger) in dankenswerter Weise der Med. Universitätsklinik zur Untersuchung überwiesen. Zum Teil handelt es sich um Patienten der Tuberkuloseabteilung der Med. Klinik.

Die Untersuchungen der Med. Klinik wurden von Herrn Dr. K. von Neergaard ausgeführt, und zwar bei den 4 Patienten der Klinik selbst im Abstand von einigen Wochen vor der Transferierung nach Davos, sowie kurz vorher, um eine Art Kurve zu bekommen, aus der leichter die beiden Komponenten einer Veränderung, nämlich einerseits die Einwirkung der Tuberkulose an sich, andererseits die Einwirkung des Klimawechsels getrennt beurteilt werden konnten. Bei den ambulanten Patienten wurde die Untersuchung in der letzten Woche vor der Abreise vorgenommen.

In Davos wurde eine erste Untersuchung meist am 2. Tage nach der Ankunft, nach 1 Tage Bettruhe vorgenommen und dann eine zweite meist im Abstand von einigen Wochen während der Kur wiederholt.

Von den Untersuchten sind 14 männlichen, 15 weiblichen Geschlechts. 5 waren unter 20 Jahren, 22 zwischen 20 und 50 Jahren und 2 über 50 Jahre. 6 Fälle gehören dem 1., 3 dem 2., 20 dem 3. Stadium nach *Turban-Gerhardt* an.

Um eine genauere Übersicht über die Ausdehnung der Tuberkulose in den einzelnen Fällen zu gewinnen, wurden nach dem Vorschlag von *Oeri*¹⁰ eine Einteilung in 6 Stadien vorgenommen. Diese Klassifikation wird gewonnen durch Addition der Zahlen, welche nach *Turban-Gerhardt* für beide Seiten getrennt festgestellt worden sind. Dadurch entstanden Gruppen von je 4—7 Fällen. Die 1. Gruppe mit nur 1 Fall wurde mit der 2. vereinigt. Die Schwere der momentanen Aktivität der Lungentuberkulose wird weitgehend durch die Größe der Senkungsreaktion dargestellt (*Neergaard*¹¹). 18 Fälle hatten eine Senkungsreaktion unter 25 mm in der 1. Stunde. Weiterhin teilten wir unsere Kranken nach dem klinischen Bild, der Ausdehnung des Befundes und der Schwere des Verlaufs in 4 Gruppen ein, die wir mit „stationär“ (6 Fälle), „wenig progredient“ (7 Fälle), „progredient“ (5 Fälle), „stark progredient“ (11 Fälle) bezeichneten.

Methodik. Die Untersuchungen wurden sämtlich morgens am nüchternen, ruhenden Patienten ausgeführt. Die letzte Mahlzeit lag 12—14 Stunden zurück.

1. *Bestimmung des Grundumsatzes.* Die Apparatur konnte aus äußeren Gründen nicht die gleiche sein. In Basel atmeten die Patienten nach $\frac{1}{2}$ stündiger Ruhe und Gewöhnung an die Atmung durch Mundstück und Condomventil in einen 150 l fassenden genau ausbalanzierten Spirometer. Da Kontrollen zeigten, daß die Zusammensetzung der Atemluft in den verschiedenen Höhen des Spirometers beträchtliche Schwankungen zeigten, wurde

ein elektrischer Ventilator eingebaut, der innerhalb einiger Minuten eine gleichmäßige Durchmischung erzielte. Aus dem Spirometer wurden Luftproben aus verschiedenen Höhen in quecksilbergefüllte Gaspipetten abgefüllt und mit dem Petterson-Högländ-Tobiesenschen Gasanalysenapparat analysiert. Da der Apparat eigentlich für Kammerversuche mit verdünnter Respirationsluft bestimmt ist, mußte die Spirometerluft jeweils auf das 5fache verdünnt werden, was mit der Gaspipette des Analysenapparates in einwandfreier Weise möglich war.

In Davos erfolgten die Untersuchungen nach dem Zuntz-Geppertschen Verfahren. Die Patienten blieben morgens nüchtern im Bett und atmeten in die kleine transportable Gasuhr durch Mundstück und Condomventil, bis die Minutenvolumina konstant wurden. Dann wurde eine Probe in eine mit angesäuertem Wasser gefüllte Gaspipette abgenommen und im Gasanalysenapparate analysiert.

2. *Bestimmung der Senkungsreaktion.* Die Senkungsreaktion wurde in Basel und Davos jeweils vor der Gaswechseluntersuchung nach der Methode von *Westergreen* vorgenommen. Die Blutentnahme erfolgte mit einer Zweikubikzentimeterspritze, die mit 0,4 ccm Natriumcitratlösung (3,8%) beschickt war. Die Ablesungen wurden nach 15, 30, 45, 60, 90, 120 Minuten und 24 Stunden vorgenommen, und zur genauen Darstellung des Senkungsablaufes die Differenzenquotienten nach *Stöcklin*¹² bestimmt.

Tabelle 1. *Veränderung des Grundumsatzes durch die Höhendifferenz. Das Ausmaß der Veränderung.*

Größe der Abnahme in %	Anzahl der Fälle	Größe der Zunahme in %	Anzahl der Fälle
0—5	6	0—5	1
5—10	4	5—10	2
10—15	10	10—15	1
15—25	3	15—25	2

3. *Bestimmung der Atemsuspension.* Die Erregbarkeit des Atemzentrums wurde mittels der Dauer des willkürlichen Atemstillstandes¹³ bestimmt. Aus äußeren Gründen konnte dies nur bei 17 Patienten ausgeführt werden. Es wurde die Zeit des Atemstillstandes nach ruhiger Expiration und nach tiefster Inspiration mit der Stoppuhr gemessen.

Resultate. Die Ergebnisse sämtlicher Versuche sind in der Tab. 6 zusammengestellt. Im einzelnen ist dazu noch folgendes zu bemerken:

1. Grundumsatz (Tab. 1, 2, 3).

Der Sauerstoffverbrauch beträgt im Mittel für Basel 253 ccm pro Minute, für Davos 238 ccm. Im Durchschnitt ist also eine Abnahme von 5,9% zu beobachten. Auch in den einzelnen Fällen ist meist eine Abnahme zu verzeichnen; wir finden 23 Fälle mit in Davos erniedrigten Sauerstoffwerten, und nur 6 mit erhöhten. Die maximalen Werte betragen bei den Abnahmen bis 22%, bei den Zunahmen bis 19%.

Berechnet man den Sauerstoffverbrauch auf den Quadratmeter Körperoberfläche, wodurch beim Gesunden sicher konstantere Verhältnisse geschaffen werden, so finden wir für Basel ein Mittel von 162 ccm und für Davos 148 ccm, d. h. auch hier eine Abnahme von 8,6%. Auch hier bewegen sich die Großzahl der Fälle, nämlich 23, im Sinne einer Abnahme, und nur 6 Fälle zeigen eine Zunahme. Die Größe der Ab- bez. Zunahme ist recht verschieden. Die Grenzwerte betragen für die Abnahmen 2,6% im Minimum, 22% im Maximum und für die Zunahmen 1 bez. 24%. Nur wenige Fälle erreichen allerdings diese extremen Werte. Etwa die Hälfte der Fälle weisen Abnahmen auf, die zwischen 5 und 15% liegen. Die Streuung ist also nicht sehr groß (Tab. 1).

Versuchen wir durch eine Unterteilung in Gruppen Aufschluß darüber zu erhalten, wieweit der tuberkulöse Prozeß an sich die Veränderung des Grundum-

satzes bei Klimawechsel beeinflußt, so finden wir folgendes: Bei einer Einteilung der Fälle, welche sich auf die Senkungsreaktion stützt, ist ein kleiner Unterschied in der Reaktion auf das Klima zu erkennen (Tab. 2). Die leichteren Fälle zeigen mit 8% im Durchschnitt eine größere Abnahme als die schwereren Fälle mit 5%. Bei der Einteilung in 6 Stadien nach *Oeri* zeigen die Fälle mit geringster und mit größter Ausdehnung im Durchschnitt die geringste Sauerstoffabnahme, während die Fälle mit mittlerer Ausdehnung die größte Abnahme aufweisen. Das gleiche Ergebnis erhalten wir auch bei einer Einteilung nach der klinischen Dignität der Fälle. Hier zeigen die mäßig progredienten Fälle im Durchschnitt die größte Abnahme des Sauerstoffverbrauchs (12%), während die stationären Fälle kaum (4%), die sehr progredienten Fälle nur eine geringe Abnahme aufweisen (Tab. 2).

Tabelle 2. Veränderung des Grundumsatzes durch die Höhendifferenz. Der Einfluß d. Tuberkulose,

Einteilung	O ₂ /Min. Basel ccm	O ₂ /Min. Davos ccm	Differenz %
Fälle mit SR. unter 25 mm	161	148	— 8,1
„ „ „ über 25 „	160	151	— 5,6
Stadium 1, 2 (<i>Oeri</i>)	155	147	— 5,1
„ 3	178	156	—12,3
„ 4	158	146	— 7,4
„ 6	161	152	— 5,7
„ 6	158	148	— 6,3
stationäre Fälle	154	148	— 3,9
wenig progrediente Fälle	158	150	— 5,0
progrediente Fälle	168	148	—11,9
stark progrediente Fälle	159	149	— 6,2

Berechnet man aus den Zahlen, die *Dumarest* und *Maignon*⁴ von ihren Untersuchungen an 15 Tuberkulösen in Lyon und Hauteville angeben, Mittelwerte, so findet man, daß der Sauerstoffverbrauch in Hauteville um 3,8% größer ist als in Lyon. Dabei ist jedoch zu bemerken, daß in 8 Fällen auch hier der Sauerstoffverbrauch abnimmt und nur in 6 Fällen zunimmt. Die Ergebnisse von *Dumarest* und *Maignon* stehen also nicht in ausgesprochenem Widerspruch mit den der vorliegenden Arbeit.

Wieweit eine Änderung des Sauerstoffverbrauchs beim Übergang ins Höhenklima durch die Tuberkuloseinfektion als solche mitbestimmt wird, ist aus den mitgeteilten Zahlen nicht mit Sicherheit zu erkennen. Vor allem kommt es darauf an, wie man die bisher vorliegenden Untersuchungen an Gesunden in mittleren Höhen interpretiert.

1911 hat *Durig*¹⁴ zusammenfassend über die vorliegenden Versuche von *Mermod*, *Mosso*, *Veragouth*, *Zuntz* und *Schumburg*, *Jaquet* und *Stachelin*, *Durig* und Frau und *Kuß* berichtet. Er gibt eine anfängliche, allmählich sich vermindernde, geringe Steigerung des Grundumsatzes an, stellt jedoch fest, daß noch zu wenig beweiskräftiges Material vorliege, um ein definitives Urteil zu fällen. Die neueren Untersuchungen von *Durig*¹⁵, *Magnus* und *Liljestrand*¹⁶, *Kestner*¹⁷, *Schneider*¹⁸ und *Loewy*¹⁹ kommen alle zum Ergebnis, daß der Grundumsatz beim

Gesunden nur in einzelnen Fällen in Höhen von 1000—2000 m ü. M., eine Steigerung gegenüber dem Tiefland erfahre, meist aber unverändert bleibt.

Hält man diese Ergebnisse den Zahlen gegenüber, welche die vorliegenden Untersuchungen ergeben, so muß daraus der Schluß gezogen werden, daß Tuberkulose die Neigung haben, beim Übergang in ein Gebirgsklima von mittlerer Höhe ihren Gaswechsel einzuschränken. Diese Herabsetzung des Grundumsatzes ist am ausgesprochensten bei mittelschweren Fällen. Schwere Fälle zeigen diese Reaktion auf die Klimawirkung nicht mehr so stark. Zur Wertung dieser Resultate ist noch die Diskussion der Fehlerquellen nötig.

Tabelle 3. Veränderung des Sauerstoffverbrauchs bei Fällen die in Basel mehrmals untersucht wurden.

Name	Zeitpunkt der Untersuchung	O ₂ /Min.	Veränderung in %	Name	Zeitpunkt der Untersuchung	O ₂ /Min.	Veränderung in %
K. W.	—47	309	} —9,8	W. F.	— 5	373	} +8,3
	— 6	296			— 3	375	
	+ 2	267			+ 8	406	
	+11	259		Z. G.	—60	284	} —1,6
K. M.	—34	296	— 5		252		
	— 5	263	+ 4		248		
	+ 3	249	+14		244		
	+14	259	S. L.	—26	302	} —3,0	
F. W.	— 2	262		— 4	302		
	— 1	252		+ 2	292		
	+ 8	240	B. A.	— 5	290	} ±0	
	+ ?	237		— 1	294		
	+45	266		+ 8	294		

Zeitpunkt der Untersuchung = Tag vor (—) oder nach (+) der Transferierung nach Davos (z. B. — 47 bedeutet 47 Tage vor der Abreise nach Davos, + 2 am 2. Tage des Davoser-Aufenthalts).


Die beiden Versuchsreihen wurden mit verschiedener Apparatur durchgeführt. Ein Vergleich beider Methoden konnte nicht unternommen werden. Ein konstanter methodischer Fehler kann also nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, wenn auch ein Anhaltspunkt für einen solchen nicht vorhanden ist.

Die Versuche in Basel sind meist die ersten Versuche an ungeübten Patienten. Es ist wohl möglich, daß trotz aller Einschärfung und Kontrolle das erstmal die Entspannung der Muskulatur nicht so völlig gelang, wie das zweite- und drittemal. Dieser Einwand wird jedoch durch die folgenden Fälle größtenteils widerlegt. In 4 eigenen Fällen und bei 3 Vorversuchen von *Loewy* und *Neergard* konnten schon in Basel 2 Gaswechselversuche ausgeführt werden. Von diesen 7 Fällen zeigen 5 eine Abnahme des Sauerstoffverbrauchs in Davos, einer zeigt eine Zunahme und einer bleibt gleich (Tab. 3). Die Abnahme des Sauerstoffverbrauchs betrug in diesen Fällen im Mittel 2,1 % (Basel 291, Davos 285 ccm pro Minute). Die größte Abnahme beträgt 9,5 %, die kleinste 4,8 %. Die größte Zunahme beträgt 8,3 %. Die Streuung ist also in diesen Fällen geringer. 5 davon sind schwere ausgedehnte Tuberkulosen, die nach den vorher erwähnten Beobachtungen (Tab. 2)

nicht stark auf den Klimareiz reagieren. Alle Abnahmen liegen jedoch über dem Mittel, welches wir für Stadium VI festgestellt haben.

Diese Untersuchungen an 7 Spitalpatienten geben uns einen wichtigen Anhaltspunkt für die Beurteilung der Gesamtergebnisse, indem sie zeigen, daß trotz vorhandener Übung infolge mehrmaliger Untersuchung im Tiefland bei 5 Fällen die Abnahme bestehen bleibt.

Die graphische Darstellung dieser Fälle (Kurve 1) zeigt sehr übersichtlich alle mitwirkenden Komponenten, da besonders die zeitlichen Verhältnisse klargelegt sind. 2 Fälle (Z. G., K. W.) zeigen in Basel schon ein leichtes Sinken des Grundumsatzes, dann beim Übergang vom Tiefland in die Höhe einen deutlichen Sprung und in Davos eine zwar etwas langsamere Abnahme, die aber immerhin rascher ist, wie vorher im Tiefland. Der Einwand, daß die Abnahme des Grundumsatzes in der Höhe einfach die Fortsetzung einer im Tiefland begonnenen Besserung der Tuberkulose sei, wird durch diese Kurven widerlegt. Bei BA. wird eine in Basel vorhandene Tendenz zur Steigerung des Grundumsatzes durch den Übergang zur Höhe auf gleichem Niveau festgehalten, d. h. relativ findet auch hier eine Abnahme statt. SL., bei welchem in Basel bei 2 Untersuchungen die gleichen Sauerstoffwerte gefunden wurden, weist beim Übergang in die Höhe eine deutliche Abnahme auf. Bei WF., der allerdings in der Tiefe in sehr kurzem Abstand untersucht wurde, scheint der Übergang zur Höhe, wenn überhaupt, eher eine Steigerung bewirkt zu haben. Er befand sich aber schon die letzte Zeit in Basel in einem Zustande der Verschlechterung. KM. scheint mit einer Abnahme des Grundumsatzes zu reagieren, kommt aber in Davos schon nach ein paar Tagen wieder auf den Wert von Basel. Auch er zeigte übrigens klinisch in den ersten Tagen in Davos eine Verschlimmerung. Ein ähnliches Verhalten finden wir bei FW. Der Anstieg bei WF. dürfte immerhin zeigen, daß der Abfall bei den anderen Fällen nicht die Folge eines systematischen Fehlers ist.



Kurve 1.

In Basel mußten, um eine weitere mögliche Fehlerquelle zu nennen, die Patienten vor dem Versuch zu Fuß ins Spital gehen, während sie in Davos im Bett bleiben konnten. Zudem waren in Davos die Patienten am Tage vor der Untersuchung im Bett. Dieser Umstand ist auch gegenüber allen Versuchen anderer Autoren

zu betonen. Auf allen bisherigen Expeditionen wurde am Tage vor der Untersuchung gearbeitet oder marschiert. Wenn auch darauf geachtet wurde, daß die Versuchspersonen mindestens $\frac{1}{2}$ Stunde vor den Versuchen ruhten, so können die höheren Werte in Basel doch auf die Muskelarbeit bezogen werden. Auch hier sind die Resultate, die wir an den 7 Spitalpatienten erhalten haben, wertvoll. Diese wurden auf den Bettwagen ins Untersuchungszimmer gefahren. Sie zeigen also die gleichen Versuchsbedingungen wie in Davos. Wenn auch sie eine Abnahme des Sauerstoffverbrauchs zeigten, spricht das für die Richtigkeit der Abnahme der übrigen Fälle.

Da in Davos das Atemvolumen der meisten Fälle geringer ist als in Basel, so ist sicher ein Teil der Abnahme des Sauerstoffverbrauchs auf die Verminderung der Atemarbeit zu beziehen. Rechnet man für 1000 ccm Minutenvolumen 5 ccm Sauerstoff, so steigt das Mittel für Davos auf 244 ccm Sauerstoff pro Minute und 154 ccm pro Quadratmeter Oberfläche, und die Abnahme beträgt für das Mittel nur noch 3,6 bez. 4,9%. Im einzelnen bleiben natürlich immer noch so große Abnahme bestehen, daß das Gesamtergebnis dadurch nicht geändert wird.

Da die Kohlensäureausscheidung wesentlich von der dem Versuch unmittelbar vorangegangenen Atemtechnik abhängig ist, so kann sie uns keinen Aufschluß über den Energiewechsel verschaffen. Wir führen daher im folgenden nur kurz einige Zahlen an, vor allem deshalb, um sie den Ergebnissen am Gesunden gegenüber zu stellen, und um auf den Parallelismus im allgemeinen mit den gefundenen Veränderungen des Sauerstoffverbrauchs hinzuweisen. Das Mittel der Kohlensäureausscheidung in Basel betrug 184 ccm pro Minute und sank auf ein Mittel von 178 ccm in Davos. Die Kohlensäureausscheidung erfuhr also eine Abnahme von 3,6%. 20 Fälle zeigen diese Veränderung im Sinne des Mittels, 9 Fälle zeigen dagegen eine Zunahme. Wie beim Sauerstoffverbrauch reagieren unsere Tuberkulösen auch bei der Kohlensäureausscheidung mit einer Abnahme und zwar etwa von gleicher Größe. Beim Gesunden wurde dagegen schon in mittleren Höhen meist ein Ansteigen der Kohlensäureausscheidung gefunden. (Bei *Jaquet* und *Stachelin* 14,8%. Lit. siehe bei *Loewy*, Handb. d. Biochemie, 4, 226. 1911.)

Da die Abnahme der Kohlensäureerzeugung geringer ist als die Abnahme des Sauerstoffverbrauchs, so wird der respiratorische Quotient etwas größer. Wir finden ihn in Basel im Mittel 0,724, in Davos 0,750 bei der ersten und 0,760 bei der zweiten Untersuchung. In 20 Fällen nimmt er zu, in 8 Fällen ab, in 1 Falle bleibt er gleich.

Interessant ist das häufige Vorkommen eines respiratorischen Quotienten unter 0,70 (in Basel 9mal, in Davos 7mal). Da wir ihn bei leichten wie bei schweren Fällen antreffen, glauben wir ihn nicht in Beziehung zur Schwere des Falles setzen zu können (*Grafe*²⁰). Die Erklärung wird eher folgende sein. Durch die ungewohnte Mundatmung wird im Beginn des Versuchs das Atemvolumen gesteigert und damit Kohlensäure aus dem Körper ausgeschwemmt. Bei eingetretener Beruhigung der Atmung wird dann mehr Kohlensäure als normal retiniert. Da dabei der Sauerstoffverbrauch konstant bleibt, so wird der respiratorische Quotient kleiner (*Loewy*²¹). Da in unseren Versuchen anzunehmen ist, daß anfangs oft eine erregte Atmung stattgefunden hat, so erklären sich die Tiefen respiratorischen Quotienten wohl.

Ziehen wir alle diese Verhältnisse in Betracht, so erscheint uns doch der Schluß gerechtfertigt, daß der Grundumsatz des Tuberkulösen sich im Hochgebirge anders verhalte wie der des Gesunden und besonders in mittelschweren Fällen eine Tendenz zur Abnahme zeigt.

2. Atemmechanik (Tab. 4).

Das *abgelesene Minutenvolumen* nimmt in 21 Fällen beim Übergang von Basel nach Davos ab, in 8 Fällen dagegen ist es gesteigert. Dieses Ergebnis steht mit den bisher gefundenen Beobachtungen an Gesunden im Widerspruch. 1911 fand *Durig* (l. c. 387), daß von 22 Personen, die zwischen 1000 und 2000 m untersucht wurden, das Minutenvolumen bei 13 zunahm, bei 6 konstant blieb und nur bei 3 abnahm. Er bemerkt jedoch, daß ein entscheidendes Wort über die Lungenventilation in mittleren Höhen noch nicht gesprochen worden sei. *Loewy* (l. c. 636) fand bei 4 untersuchten Personen 2 mal eine Abnahme, 1 mal Konstanz und 1 mal Zunahme des Minutenvolumens.

Das *reduzierte Atemvolumen* beträgt im Mittel in Basel 5785 ccm und sinkt in Davos auf 4548 ccm in der ersten und 4509 ccm in der zweiten Untersuchung. In 27 Fällen ist eine Abnahme ausgesprochen vorhanden, ein einziger Fall zeigt eine Zunahme und einer zeigt in Davos den gleichen Wert wie in Basel. Die Abnahme beträgt im Mittel 20.9%, zeigt aber in einzelnen Fällen Werte bis zu 50%. Beim Gesunden ist die Abnahme des reduzierten Volumens beim Übergang aus dem Tiefland ins Hochgebirge bekannt. (Lit. s. *Loewy*, l. c. S. 231.)

Beim Tuberkulösen liegen verschiedene Beobachtungen vor. Aus den Zahlen von *Dumarest* und *Maignon* läßt sich eine Abnahme des reduzierten Atemvolumens von 7.4% berechnen. 7 seiner Fälle zeigen diese Abnahme, 5 dagegen eine Zunahme 2 bleiben sich gleich. *Brieger*²² verglich die Atemvolumina von 47 Krankenhauspatienten im Tiefland mit denen von 51 allerdings weniger Schwerkranken Sanatoriumspatienten in Davos. Er fand bei den stationären wenig ausgedehnten Lungentuberkulösen eine Steigerung von 20—30%, bei schweren ausgedehnten progredienten Fällen dagegen keine Steigerung. *Brieger* hatte jedoch im Tiefland und im Hochgebirge ein verschiedenes Material zur Verfügung, so daß ein Vergleich mit unseren Werten nicht möglich ist. Daß die Aktivität der Tuberkulose auf die Veränderung des Atemvolumens einen Einfluß hat, können wir an unserem Material bestätigen. Die Fälle mit hoher Senkungsreaktion zeigen eine geringere Abnahme des Atemvolumens als die mit niedriger Senkungsreaktion (Tab. 4). Größeren Einfluß auf die Atemmechanik scheint die Ausdehnung des Lungenprozesses der Krankheit zu, dagegen ist die Abnahme in der Höhe gegenüber dem Tiefland bei den leichten Fällen größer. Es scheint also, daß der Einfluß des Klimas auf die Atemmechanik bei ausgedehnten Lungenprozessen nicht mehr so zum Ausdruck komme, wie das bei wenig ausgedehnten Prozessen der Fall ist. Wir finden also ein ähnliches Verhalten wie beim Grundumsatz. Die an sich größere Höhe des Atemvolumens der schweren Fälle steht im Vordergrund, so daß die Klimawirkung bei ihnen weniger zur Geltung kommt. Da der Grundumsatz bei den schweren Fällen nicht erhöht war, ist das größere Atemvolumen der schwereren Fälle wohl eher als reflektorische Überkompensa-

tion aufzufassen, wie sie von *Stachelin* und *Schütze*²³ beim Asthma und Emphysem angenommen wurde.

Was die Atemfrequenz anbelangt, so ist bekannt, daß sie in mittleren Höhen beim Gesunden teils erhöht, teils erniedrigt gefunden wurde, und zwar betrug die Veränderung häufig eine Zunahme von etwa 3 Atemzügen pro Minute (*Loewy* l. c. 228).

In unserem Material ist im Mittel eine Abnahme festzustellen, die etwa 2 Atemzüge in der Minute ausmacht. In 21 Fällen nimmt die Atemfrequenz ab, im Maximum um 8,5 Atemzüge, in 7 Fällen nimmt sie zu, im Maximum um 4,8 Atemzüge; im allgemeinen ist jedoch das Mittel aus einer relativ geringen Streuung gewonnen.

Zusammenfassend ist über die Atemmechanik zu sagen, daß bei 29 Fällen von Lungentuberkulose beim Übergang vom Tiefland in mittlere Höhen eine Abnahme des Atemvolumens und der Atemfrequenz beobachtet wurde. Noch mehr

Tabelle 4. *Veränderungen des Atemvolumens verglichen mit Senkungsreaktion und Ausdehnung der Tuberkulose.*

Einteilung	Atemvolumen red/Min.		Differenz %
	Basel ccm	Davos ccm	
Fälle mit SR. unter 25 mm	5854	4501	— 23,1
„ „ „ über 25 „	5673	4594	— 19,0
Stadium 1, 2 (<i>Oeri</i>)	5319	3979	— 25,2
„ 3	6071	4422	— 27,2
„ 4	5411	4149	— 22,8
„ 5	5775	4775	— 17,3
„ 6	5895	4926	— 16,3

als beim Grundumsatz sind jedoch hier die dort angeführten Bedenken gegen die absolute Richtigkeit des Resultates unserer Untersuchungen angebracht. Die Atemmechanik wird durch äußere Reize, durch psychischen Alteration und durch die Aufmerksamkeit des Untersuchten so leicht verändert, daß sie eine der am schwierigsten festzustellenden Körperfunktionen darstellt. Die hohen Werte in Basel sind zum Teil sicher der Aufregung des Patienten beim ersten ungewohnten Versuche zuzuschreiben.

3. *Senkungsreaktion* (Tab. 5).

Der Einstundenwert zeigt im Mittel zwischen Basel (30,4 mm) und Davos (30,5 mm) keine Veränderung. Der Zweistundenwert ist in Davos mit 51,1 um 13% niedriger als in Basel mit 58,7 mm. Im einzelnen zeigen aber schon die Stundenwerte in den meisten Fällen eine geringe Abnahme: in 19 Fällen nimmt der Wert ab, in 6 Fällen zu, in 2 Fällen bleibt er gleich. Im Zweistundenwert wird das noch deutlicher: 22 Fälle zeigen eine Abnahme des Wertes, 5 Fälle eine Zunahme. Über das Ausmaß der Ab- bzw. Zunahme gibt Tab. 5 Auskunft. Es ist daraus ersichtlich, daß die Abweichungen sich ziemlich geschlossen in geringen Graden halten. Über die Hälfte der Fälle mit Abnahme liegen zwischen 0 und 5 mm.

Diese Abnahme ist wahrscheinlich als Klimawirkung aufzufassen. Daß die Änderung der Senkungsreaktion nicht einer Änderung der Krankheit entspricht, ist bei der geringen zeitlichen Distanz der Untersuchungen wohl sicher. Man würde zum vornherein eher erwarten, daß die Reise von Basel nach Davos die Kranken schlecht beeinflussen und die Senkungsreaktion erhöhen würde. Dafür sprechen jedoch die vorliegenden Untersuchungen nicht. Die Senkungsreaktion wird im Durchschnitt also in gleichem Sinne wie der Grundumsatz verändert; im einzelnen Falle besteht allerdings der Parallelismus zwischen Veränderung der Senkungsreaktion und des Grundumsatzes nicht.

Auffallend ist, daß in Davos viel häufiger (11 Fälle) unscharfe Grenzen der Erythrocytensäule beobachtet wurde als in Basel (2 Fälle). Da nach *Stöcklin*¹²

die Größe der unscharfen Zone im allgemeinen mit der Größe der Senkungsreaktion steigt, ist dieser Befund auffallend und zeigt, wie schon *Stöcklin* betont hat, daß noch andere Faktoren, die wir zum Teil nicht kennen, mit eine Rolle spielen.

Da wir über den Verlauf der Senkungsreaktion, wie *Stöcklin* gezeigt hat, durch die Angabe des maximalen Differenzenquotienten eine genauere Darstellung bekommen, als es mit Hilfe

Tabelle 5. Veränderung der Senkungsreaktion durch die Höhendifferenz.

Größe der Veränderung in mm	1 Std.-Wert Zahl der Fälle	2 Std.-Wert Zahl der Fälle	Max. Diff. Quot. Zahl der Fälle
—100 bis — 51	0	0	2
— 50 „ — 41	0	1	1
— 40 „ — 31	0	3	2
— 30 „ — 21	3	3	0
— 20 „ — 11	3	2	2
— 10 „ — 6	2	2	2
— 5 „ — 1	12	12	7
+ 1 „ + 5	1	0	2
+ 6 „ + 10	4	0	3
+ 11 „ + 20	0	3	3
+ 21 „ + 30	1	1	1
+ 31 „ + 40	0	1	0
+ 41 „ + 50	0	0	0
+ 51 „ —100	0	0	1

des Ein- und Zweistundenwertes möglich ist, wurde auch in unseren Fällen viertelstündlich abgelesen und aus diesen Werten die maximale Senkungsgeschwindigkeit berechnet. Die maximale Senkungsgeschwindigkeit beträgt im Mittel in Basel 54,6 mm pro Stunde, in Davos 51,5 mm. Wir finden also eine Abnahme von 5,7%. Die größere Zahl der Fälle zeigt einen Ausschlag im Sinne des Mittels: 16 nehmen ab, 10 nehmen zu, 1 bleibt gleich. Der Zeitpunkt des maximalen Differenzenquotienten verschiebt sich beim Übergang ins Hochgebirge nach rechts in 14 Fällen, nach links in 4 Fällen und tritt zu gleicher Zeit in 9 Fällen ein. Die maximale Senkungsgeschwindigkeit tritt also in Davos später ein als in Basel.

Berücksichtigen wir die gleichsinnige Abnahme des Grundumsatzes und der Senkungsreaktion beim Übergang der Tuberkulösen in die Höhe, so liegt der Gedanke nahe — soweit aus unseren Untersuchungen schon bindende Schlüsse gezogen werden dürfen — daß die Höhenklimatherapie der Tuberkulose nicht als Reiz-, sondern als Schonungstherapie aufzufassen ist. Das gilt besonders für die leichten, therapeutisch günstigeren Fälle. Wieweit aus dem Verhalten des Grundumsatzes beim Übergang in die Höhe Schlüsse prognostischer Art gezogen

Name, Geschl. Alter, Länge, Stadium. Path. Form, Progredienz.	Gewicht kg	Datum	Tag der Kur	Atemvolumen		Atem- freq.	Atem- tiefe ccm
				nicht red. ccm	red. ccm		
1. H. H., ♂, 23 Jahre; L. 178 cm R II. L III = V prod. Progr. +. Cav. Tbb +	64,0 64,0 66,2 67,4	6. XII. 11. XII. 6. I. 25. III.	— 4 + 2 + 28 + 106	7254 7000 7200 6733	6593 5139 5277 4865	11 16 14 15	403 437 514 449
2. M. H., ♀, 34 Jahre; L. 156 cm R I. L I = II prod. tbc. Sal- pingitis. Progr. 0. Tbb —	36,6 36,6 36,9 36,9	15. XI. 22. XII. 12. I. 17. III.	— 35 + 3 + 24 + 88	6660 5580 4917 4029	5779 4084 3612 2956	18 14 14 12	370 398 351 326
3. W. A., ♂, 39 Jahre; L. 165 cm R I. L I = II prod. Progr. + Tbb —	67,5 67,5 68,8	21. I. 29. I. 13. II.	— 2 + 7 + 22	4945 4500 5029	3964 3276 3600	9 12 10	549 375 503
4. F. E., ♂, 41 Jahre; L. 161 cm R I. L I = II prod. Progr. 0 Tbb —	71,4 71,4 73,4	27. I. 3. II. 16. II.	— 3 + 5 + 18	7490 6440 6300	6222 5039 4533	18 16 14	416 402 450
5. S. E., ♀, 37 Jahre; L. 159 cm R II. L III = V prod. Progr. ++. Cav. Struma Tbb +	58,3 58,3 58,5	30. I. 11. II. 24. II.	— 5 + 8 + 21	6433 5966 6180	5074 4377 4475	19 16 16	350 373 386
6. E. J., ♀, 34 Jahre; L. 166 cm R I. L III = IV prod. Progr. +++. Cav. Tbb +	51,3 51,3 52,3	30. I. 11. II. 25. II.	— 5 + 8 + 22	6833 5720 6000	5659 4120 4286	21 18 17	325 318 353
7. K. G., ♀, 18 Jahre; L. 160 cm R I. L I = II exsud. Progr. ++. Tbb +.	51,9 51,9 53,3	3. II. 12. II. 25. II.	— 1 + 9 + 22	5230 5028 4883	4455 3617 3536	17 14 12	304 359 406
8. R. W., ♂, 55 Jahre; L. 160 cm R II. L I = III prod. Progr. ++. Lebercirrh. Tbb +	61,7 61,7 65,4	11. II. 14. II. 2. III.	— 2 + 2 + 18	9667 8750 10667	8238 6226 7596	22 20 16	430 438 667
9. K. M., ♀, 42 Jahre; L. 162 cm R III. L II = V prod. Lupus. Progr. ++. Cav. Tbb +	47,3 47,3 48,0	5. II. 16. II. 2. III.	— 7 + 5 + 19	7728 6525 5960	6678 4659 4243	23 18 18	338 362 331
10. B. A., ♀, 24 Jahre; L. 156 cm R 0. L I = I prod. Progr. 0. Hilusdrüsen. Tbb —	50,3 50,3 49,3	3. II. 17. II. 3. III.	— 4 + 11 + 25	5633 5860 5266	4811 4220 3750	17 16 18	326 366 292
11. Z. G., ♂, 47 Jahre; L. 169 cm R III. L III = VI prod. Progr. +++. Cav. Tbb +	61,4 58,8 58,8 60,7	19. XII. 13. II. 21. II. 3. III.	— 60 — 5 + 4 + 14	7780 8922 6980 7050	7180 8092 5088 5082	14 17 19 14	567 522 367 503
12. R. E., ♂, 21 Jahre; L. 177 cm R III. L III = VI exsud. Pro- gred. ++. Cav. Tbb +	59,8 59,8 61,4	18. II. 23. II. 10. III.	— 3 + 3 + 18	6760 6280 5800	5595 4431 4916	15 14 14	451 433 485
13. H. F., ♂, 45 Jahre; L. 165 cm R III. L III = VI exsud. Pro- gred. ++. Cav. Tbb +	59,9 59,9	11. II. 24. II.	— 2 + 12	5031 5600	4304 4057	21 14	398 400
14. S. M., ♀, 52 Jahre; L. 152 cm R I. L I = II prod. Progr. 0. Struma. Tbb —	48,7 48,7 50,2	20. II. 26. II. 13. III.	— 5 + 2 + 17	6220 5900 5083	5619 4277 3726	23 22 18	272 268 282

* Stab 1: L = Länge (in cm) R (L) = Angabe der Seite für Stadieneinteilung nach Turban-Gerhardt.
 prod. = vorwiegend produktiv, exsud. = vorwiegend exsudativ. Progr. 0 = stationär, Progr. + = wenig
 progredient, Progr. ++ = progredient, Progr. +++ = stark progredient. Tbb = Tuberkelbazillen Cav. =
 Caverne. Stab 4: siehe Erklärung zu Tabelle 3. Stab 16: Die erste Zahl bedeutet die maximale Senkungs-
 geschwindigkeit, die zweite diejenige Viertelstunde, in welcher die max. Senkungsgeschwindigkeit erreicht
 wurde. Stab 17 u. 18: I = nach ruhiger Expiration, II = nach forcierter Inspiration.

Tabelle 6.*

CO ₂ pro Min. ccm	O ₂ pro Min. ccm	CO ₂ /O ₂	O ₂ -Verbrauch		Senkungsreaktion			Atemsuspension	
			pro kg ccm	pro qm ccm	1 Std. Wert mm	2 Std. Wert mm	max. Diff. Quot.	I Sek.	II Sek.
231	314	0,737	4,9	174	17	41	28/3	—	—
207	271	0,764	4,2	150	12	42	22/4	—	—
221	272	0,815	4,1	150	6	20	14/6	—	—
223	316	0,821	4,6	168	6	16	12/8	—	—
165	229	0,720	4,3	152	—	—	—	—	—
158	205	0,771	3,8	136	—	—	—	—	—
141	169	0,832	3,1	111	—	—	—	—	—
143	200	0,716	3,5	129	—	—	—	—	—
178	246	0,721	3,6	138	3	9	7/8	39	70
183	237	0,774	3,5	133	3	8	6/8	25 ² / ₅	57
186	264	0,706	3,8	148	2	6	4/6	—	—
207	261	0,791	3,7	149	3	6	4/4	16	33
209	276	0,758	3,9	157	2	5	4/3	12 ⁴ / ₅	27 ⁴ / ₅
182	253	0,718	3,4	142	2	4	10/6	—	—
163	247	0,661	4,2	154	20	48	36/6	16 ⁴ / ₅	31
163	202	0,809	3,4	126	25	61	39/6	8 ¹ / ₅	13 ² / ₅
166	220	0,753	3,7	138	—	—	—	—	—
157	251	0,626	4,9	173	67	92	116/2	18 ¹ / ₅	43 ² / ₅
154	196	0,787	3,8	135	96	125	124/2	17	28
165	219	0,754	4,2	139	—	—	—	—	—
150	240	0,625	4,6	158	36	66	48/3	—	—
159	223	0,715	4,2	146	32	65	40/4	—	—
140	189	0,737	3,5	123	25	37	10/6	—	—
216	316	0,686	5,1	193	25	67	68/4	—	—
208	271	0,767	4,4	165	13	35	24/6	—	—
187	291	0,644	4,4	174	—	—	—	—	—
177	259	0,684	5,5	176	47	81	60/3	—	—
172	228	0,763	4,7	154	30	49	40/3	—	—
159	206	0,769	4,3	138	48	64	—	—	—
169	243	0,694	4,8	164	5	14	9/6	—	—
169	218	0,775	4,3	147	2	5	4/6	—	—
152	199	0,767	4,0	136	5	15	8/4	—	—
176	284	0,892	4,6	166	—	—	—	—	—
188	252	0,744	4,3	151	86	103	160/2	—	—
163	248	0,655	4,2	147	64	80	180/3	—	—
179	244	0,736	4,0	143	75	100	160/2	—	—
221	311	0,711	5,2	181	47	82	68/3	—	—
179	256	0,697	4,2	149	23	55	36/4	—	—
212	261	0,812	4,2	148	35	65	76/3	—	—
123	193	0,639	3,2	116	61	94	80/2	—	—
164	230	0,713	3,8	138	34	53	48/4	—	—
166	250	0,661	5,1	175	—	—	—	15 ² / ₅	31 ⁴ / ₅
150	217	0,693	4,4	152	—	—	—	18	24
141	188	0,752	3,7	130	—	—	—	—	—

Name, Geschl. Alter, Länge, Stadium, Path. Form, Progredienz.	Gewicht kg	Datum	Tag der Kur	Atemvolumen		Atem- freq.	Atem- tiefe ccm
				nicht red. ccm	red. ccm		
15. K. M., ♀, 32 Jahre; L. 158 cm R III. L II = V prod. Progr. +++ Cav. Tbb +	35,2 35,2 36,7	19. II. 26. II. 23. III.	— 6 + 2 + 25	5275 7500 5240	4519 5397 3748	21 23 21	256 332 250
16. K. W., ♂, 17 Jahre; L. 172 cm R III. L III = VI exsud. Progr. +++ Cav. Tbb +	55,3 51,1 50,7 52,4	15. I. 26. II. 5. III. 14. III.	— 47 — 6 + 2 + 11	12920 8233 8160 8500	10806 6714 5856 6289	39 23 18 25	330 357 453 445
17. B. K., ♂, 30 Jahre; L. 175 cm R III. L III = VI prod. Progr. + Cav. Tbb +	65,3 65,3 66,4	26. II. 5. III. 16. III.	— 6 + 2 + 13	7575 6575 5800	6417 4742 4229	19 11 10	399 598 563
18. K. F., ♂, 28 Jahre; L. 175 cm R I. L I = II prod. Progr. 0. Tbb +	65,2 65,2 65,7	24. II. 6. III. 16. III.	— 8 + 3 + 13	11530 6460 6200	8028 4729 4551	21 14 17	553 461 374
19. H. E., ♀, 27 Jahre; L. 166 cm R III. L III = VI prod. Progr. ++ Cav. Tbb +	42,7 42,7 43,8	25. II. 6. III. 20. III.	— 7 + 3 + 14	6386 6625 5640	5469 4839 4122	18 16 17	345 414 332
20. M. M., ♀, 31 Jahre; L. 164 cm R II. L II = IV prod. Progr. + Pneumothorax. Tbb +	55,0 55,0 55,0	4. III. 7. III. 21. III.	— 2 + 2 + 16	5187 5300 6025	4239 3884 4384	16 15 17	314 346 361
21. A. M., ♀, 34 Jahre; L. 158 cm R III. L I = IV exsud. Progr. + Cav. Tbb +	51,3 51,3	3. III. 9. III.	— 3 + 4	6300 5700	5347 4067	24 21	265 271
22. B. N., ♀, 28 Jahre; L. 153 cm R III. L I = IV prod. Progr. +++ Tbc. lar. Tbb +	42,0 42,0 42,3	4. III. 9. III. 23. III.	— 3 + 4 + 18	5537 4900 4867	5290 4097 3480	17 18 17	316 265 286
23. S. H., ♂, 23 Jahre; L. 177 cm R II. L I = III prod. Progr. + Tbb +	65,6 65,6 66,8	6. III. 12. III. 24. III.	— 5 + 2 + 14	6528 8000 6680	6009 5832 4822	17 16 16	384 485 410
24. W. F., ♂, 36 Jahre; L. 167 cm R III. L I = IV prod. Progr. + Cav. Tbb +	56,6 56,6	5. III. 12. III.	— 6 + 2	7171 6300	6056 4581	18 16	369 404
25. K. M., ♂, 20 Jahre; L. 163 cm R III. L III = VI prod. Progr. +++ Cav. Tbb +	53,2 53,7 52,5 53,9	4. II. 6. III. 13. III. 24. III.	— 34 — 5 + 3 + 14	9033 7513 7480 6850	7982 6287 5503 4935	27 16 17 13	328 698 440 507
26. S. L., ♂, 23 Jahre; L. 177 cm R II. L III = V prod. Progr. + Cav. Tbb +	67,5 70,6 71,7	26. II. 20. III. 26. III.	— 26 — 4 + 2	6712 7543 6060	5346 6069 4303	11 14 9	617 538 673
27. K. K., ♀, 19 Jahre; L. 158 cm R 0. L III = III prod. Progr. +++ Cav. Tbb +	48,3 49,5	22. I. 25. III.	— 1 + 84	8262 5340	7748 3840	23 19	359 360
28. S. R., ♀, 18 Jahre; L. 170 cm R I. L III = IV prod. Progr. +++ Cav. Tbb +	42,1 44,2	27. I. 19. III.	— 3 + 49	5533 4850	4866 3555	20 20	278 243
29. A. M., ♀, 18 Jahre; L. 159 cm R III. L III = VI exsud. Progr. +++ Cav. Tbb +. Hals- drüsentbc.	49,9 50,6	25. II. 19. III.	— 8 + 16	5800 5050	4805 3706	19 19	306 206

CO ₂ pro Min. ccm	O ₂ pro Min. ccm	CO ₂ /O ₂	O ₂ -Verbrauch		Senkungsreaktion			Atemsuspension	
			pro kg ccm	pro qm ccm	1 Std. Wert mm	2 Std. Wert mm	max. Diff. Quot.	I Sek.	II Sek.
134	180	0,744	5,1	141	75	113	156/2	9 ² / ₅	21
182	223	0,814	6,3	175	48	81	85/3	15 ² / ₅	16
126	161	0,780	4,4	124	28	58	44/3	—	—
251	309	0,813	5,6	187	63	98	92/3	7	25
200	296	0,677	5,7	185	106	119	172/2	11 ² / ₅	17
182	267	0,683	5,2	168	98	117	244/2	8	16
212	259	0,820	4,9	161	75	112	—	—	—
215	283	0,760	4,3	158	21	47	30/4	19 ¹ / ₅	53
231	288	0,801	4,4	160	19	44	26/6	16	28
206	282	0,831	4,2	157	9	23	18/8	—	—
237	263	0,901	4,0	147	7	19	13/8	—	—
207	288	0,718	4,4	160	6	16	12/8	—	—
200	263	0,758	4,0	146	5	15	12/8	—	—
169	229	0,737	5,6	159	20	45	28/4	9	15
158	217	0,727	5,0	150	17	42	34/6	8 ² / ₅	19 ¹ / ₅
161	216	0,745	4,9	149	11	30	22/6	—	—
154	204	0,755	3,7	128	22	48	32/6	12 ² / ₅	47 ² / ₅
150	226	0,663	4,1	141	17	45	30/8	15 ¹ / ₅	26
168	210	0,796	3,8	132	15	35	22/6	—	—
170	235	0,721	4,6	158	9	24	16/6	20 ³ / ₅	47 ³ / ₅
153	208	0,738	4,0	139	8	24	20/8	17	31 ² / ₅
168	222	0,748	5,3	165	53	88	144/3	25	64
161	216	0,746	5,1	161	49	85	56/4	23	44 ¹ / ₅
142	182	0,778	4,3	134	53	92	80/3	—	—
209	286	0,737	4,4	169	7	21	24/6	22 ¹ / ₅	43
241	277	0,869	4,2	161	4	5	6/3	15 ² / ₅	41 ² / ₅
209	252	0,827	3,8	134	3	7	4/4	—	—
209	274	0,763	4,2	157	7	17	11/8	13 ² / ₅	31 ² / ₅
186	240	0,775	3,7	138	7	13	10/3	18	30
212	296	0,716	5,6	189	43	77	56/2	15	50
208	263	0,791	5,0	168	64	99	100/3	29 ³ / ₅	51 ¹ / ₅
189	249	0,758	4,7	160	73	95	124/3	—	—
204	259	0,788	4,8	165	55	93	—	—	—
230	302	0,764	4,5	164	8	29	26/8	—	—
238	302	0,790	4,3	161	9	27	18/8	—	—
233	292	0,799	4,0	155	8	20	12/6	—	—
178	244	0,729	5,0	166	18	40	24/3	41 ² / ₅	51
151	219	0,690	4,4	148	28	57	40/4	13 ¹ / ₅	22
158	227	0,698	5,4	155	15	29	20/3	—	—
142	201	0,790	4,5	135	23	52	32/3	—	—
170	222	0,768	4,4	148	74	101	100/2	—	—
146	191	0,763	3,8	127	82	119	108/3	—	—

bzw. Indikationen für die Klimatotherapie praktisch aufgestellt werden können, müssen weitere Untersuchungen zeigen.

4. *Atemsuspension.*

Loewy (l. c. S. 644) hat ein sprungweises Sinken der Dauer der Atemsuspension von Zürich nach Davos festgestellt. Er glaubt nicht, eine Steigerung der Erregbarkeit des Atemzentrums mit zunehmender Höhe daraus folgern zu können. Die Bedingungen, an welche die Dauer der willkürlichen Atemsuspension gebunden ist, sind zu vielfältig. Umfang und Form der Atemmechanik, Lungenstellung, Höhe des Stoffwechsels und in unseren Fällen der pathologische Prozeß der Lunge und nicht zuletzt die Willenskraft des Untersuchten wirken bestimmend auf die Atemsuspension ein. Binet (l. c. 381) findet bei Gesunden eine Dauer von 45—100 Sek., bei Herzkranken im Mittel 19 Sek., bei Tuberkulösen im Mittel 14 Sek. Wir können diese beiden Beobachtungen im allgemeinen bestätigen. Von unseren 17 Patienten nimmt bei 13 die Dauer der willkürlichen Atemsuspension nach ruhiger Expiration, bei 4 nach forcierter Inspiration ab. Im Mittel finden wir in Basel 19 Sek., in Davos 16 Sek. nach ruhiger Expiration. 41 resp. 30 Sek. nach forcierter Inspiration. Im Mittel zeigt sich also eine Abnahme von 14 resp. 25% zwischen Basel und Davos. Unsere Mittel liegen etwas über den von Binet angegebenen. Allerdings ist fast durchweg in den einzelnen Fällen der Einfluß der Ausdehnung der Lungentuberkulose auf die Dauer der Atemsuspension festzustellen. Zudem sind unsere Heilstättepatienten wohl nicht so schwere Fälle wie die von Binet untersuchten Spitalpatienten.

Zusammenfassung.

1. Es wurden vergleichende Untersuchungen von Grundumsatz, Senkungsreaktion und willkürlicher Atemsuspension an Tuberkulösen im Tiefland (Basel) und Hochgebirge (Davos) vorgenommen.
2. Der Grundumsatz nahm im Mittel in der Höhe gegenüber dem Grundumsatz der gleichen Patienten im Tiefland ab. Die leichteren Fälle zeigten eine größere Einschränkung des Grundumsatzes als die schwereren.
3. In Übereinstimmung mit der Veränderung des Grundumsatzes nahm im Durchschnitt auch die Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen in der Höhe ab.
4. Die Atemsuspension war in der Höhe verkürzt.
5. Nach den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchungen scheint die Klimatotherapie der Tuberkulose nicht eine Reiz-, sondern eher eine Schonungstherapie zu sein.

Herrn Prof. R. Staehelin spreche ich für die Anregung zu dieser Arbeit, den Herren Prof. A. Loewy und Priv.-Doz. Dr. K. v. Neergaard für die Leitung und Überwachung der Versuche, ferner Herrn Dr. F. Oeri für die Überlassung des Materials meinen besten Dank aus.

Literaturverzeichnis.

- ¹ Hill und Campbell, Brit. med. journ. 1922, Nr. 3193. — ² Vogel-Eygern, Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. **57**, 65. 123. — ³ Lanz, Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. **61**, 97. 1925. — ⁴ Dumarest und Maignon, Rev. de la tubercul. II. série **9**, 19. 1912. — ⁵ Hediger, Schweiz. med. Wochenschr. **53**, 353. 1923. — ⁶ Binet, Presse méd. **28**, 381. 1920. — ⁷ Hasselbach und Lindhard, Skand. Arch. f. Physiol. **25**, 361. 1911. — ⁸ Rohrer, Ann. d. schweiz. Ges. f. Balneol. **17**. 1922. — ⁹ Loewy, Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. **207**, 632. 1925. — ¹⁰ Oeri, Jahresberichte der Baseler Heilstätte Davos 1924, S. 45. — ¹¹ Neergaard, Schweiz. med. Wochenschr. **53**, 1122. 1923. — ¹² Stöcklin, Zeitschr. f. klin. Med. **104**, 662. 1926. — ¹³ Loewy, Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. **207**, 644. 1925. — ¹⁴ Durig, Denkschriften d. Akad. d. Wiss. Wien **86**, 153. 1911. — ¹⁵ Durig, Biochem. Zeitschr. **39**, 435. 1912. — ¹⁶ Magnus und Liljestrang, Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. **193**, 527. 1922. — ¹⁷ Kestner, Klin. Wochenschr. **4**, 910. 1925; Klimastudien auf Teneriffa 1926. — ¹⁸ Schneider, Americ. journ. of physiol. **65**, 107. 1923. — ¹⁹ Loewy, Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. **207**, 632. 1925. — ²⁰ Graefe, Dtsch. Arch. f. klin. Med. **95**, 543. 1909. — ²¹ Loewy, Oppenheimers Handbuch der Biochemie. Bd. IV, S. 161. 1911. — ²² Brieger, Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. **61**, 55. 1925. — ²³ Staehelin und Schütze, Zeitschr. f. klin. Med. **75**, 1. 1919. —

